Doppelt pos. T-Zellen(CD3+/CD4+/CD8+) im EDTA-Blut (%)

Abnahmevorschrift	EDTA Vollblut Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Freitag 12.00 angeboten. Immunphänoptypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 1-2 Werktagen
Einheit	%
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 11.00 Uhr
Klinische Hinweise	Relativer Anteil doppelt positiver T-Zellen (CD3+/ CD4+/ CD8+). Einzelne T-Zellen können sowohl das Oberflächenmolekül CD4 als auch CD8 tragen und werden daher als doppelt positiv bezeichnet. Sie gelangen bei rascher Neubildung von T-Zellen gelegentlich vorzeitig aus dem Thymus ins Blut und werden daher auch als Prä-T-Lymphozyten bezeichnet. Bei diesem Parameter handelt es sich um einen Forschungsparameter für den kein Referenzbereich verfügbar ist.
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	

Alter	Referenzbereich
≤ 3M	0.5 - 1.2
3M - 2J	0.2 - 0.9
2J - 6J	0.1 - 0.7
6J - 12J	0.2 - 0.9
12J - 18J	0.2 - 1.6
> 18J	0.3 - 1.6

Verfahren	Flowzytometrie
letzte Änderung	18.03.2026 15:34