Basophile Granulozyten (abs.)

Abnahmevorschrift	voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich
Alternative Messeinheit	pro nL
Einheit	GPT/L
Häufigkeit	werktags, normalschichtig
Klinische Hinweise	Basophile Granulozyten exprimieren den IgE-Rezeptor und nach dessen Stimulation setzen sie Effektormoleküle, wie Histamin, Proteasen, Lipidmediatoren und Interleukine frei. Basophile beschleunigen die Th2-Immunantwort. Basophilie: - Allergische Entzündungen Medikamenten- oder Nahrungsmittelüberempfindlichkeit Urtikaria Eryhthrodermie - myeloproliferative Erkrankungen wir chronisch myeloische Leukämie, Polyzythämie - Colitis ulcerosa, rheumatoide Arthritis - Parasitäre Infektionen - Tuberkulose, Varizella
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	
Umrechnungsfaktor	1 (***Hinweis:*** *Ergebnis * 1 = Wert in pro nL*)
Verfahren	mikroskopische Zählung
letzte Änderung	18.03.2026 14:26

Alter	Referenzbereich
≤ 5T	0,00 - 0,64
5T - 1W6T	0,00 - 0,25
1W6T - 1J	0,00 - 0,23
1J - 3J	0,00 - 0,20
3J - 5J	0,00 - 0,20
5J - 9J	0,00 - 0,20
9J - 16J	0,00 - 0,20
> 16J	0,00 - 0,20