

## IgG-4 Pferdefliege i201

<b>Abnahmevorschrift</b>	<p>-diese spez.IgG4-Anforderungen ist aus fachlichen Gründen eingestellt-</p> <p>.</p> <p>Indikation IgG-4-Bestimmung nur empfohlen bei ausgewählter SIT (Biene, Wespe, Tiere, Milben, Mehle -&gt; generell nur für Forschungszwecke)</p> <p>Beachte: IgG-4-Bestimmung ist kein Kriterium für den Erfolg einer Hyposensibilisierung</p> <p>- Verlaufskontrolle bei Spezifischer Immuntherapie (SIT) für Forschungszwecke,</p> <p>- Bestimmung des spez. IgG4 vor und nach SIT (in Abhängigkeit des Allergens und der Therapiestrategie kommt es zu einem Anstieg des spez.IgG-4)</p> <p>Beachte: IgG-4-Bestimmung ist kein Kriterium für den Erfolg einer Hyposensibilisierung</p> <p>.</p> <p>Hinweise:</p> <p>-&gt; Referenzwerte sind nicht definiert,</p> <p>.</p> <p>Ansprechpartner:</p> <p>Labormodul Allergiediagnostik, Tel.: 1-3312</p> <p>.</p> <p>Literatur:</p> <p>siehe auch Leitlinien zu Typ-I-Allergie, Nahrungsmittelallergie, Spezifische Immuntherapie in den jeweilig aktuellen Fassungen</p> <p>.</p> <p>Letzte Aktualisierung</p> <p>23.07.2014</p>
<b>Einheit</b>	mg/L
<b>Material</b>	Serum
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Referenzbereich</b>	nicht definiert
<b>letzte Änderung</b>	29.11.2024 11:52