CD4+/CD45RO+/CD45RA- im EDTA-Blut (GPt/L)

Abnahmevorschrift	EDTA Vollblut Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Freitag 12.00 angeboten. Immunphänoptypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 1-2 Werktage
Einheit	GPt/L
Klinische Hinweise	Indikation: Immunstatus Absolute Anzahl natürlicher Killer Zellen (CD3-/CD16+/CD56+). Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) sind Effektorzellen des angeborenen Immunsystems. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Immunabwehr von Tumoren, bei viralen Infektionen, bei Organtransplantation und bei Graft-versus-Malignancy Effekten. Natürliche Killerzellen können außerdem die Funktion anderer Immunzellen (z.B. dendritischen Zellen, Makrophagen) regulieren.
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	

Alter	Referenzbereich
≤ 3M	0.060 - 0.900
3M - 6M	0.120 - 0.630
6M - 1J	0.130 - 0.800
1J - 2J	0.210 - 0.850
2J - 6J	0.220 - 0.660
6J - 12J	0.230 - 0.630
12J - 18J	0.240 - 0.700
> 18J	0.200 - 0.740

letzte Änderung	18.03.2026 14:52