

IgE Gelatine c74

Abnahmevorschrift	<p>Details zur spez. IgE-Bestimmung (Typ-I-Allergie) siehe bitte iXCAT-Eintrag IgE,gesamt (Analysen-Nr. 7053, a-IgE)</p> <p>.</p> <p>Bewertung spez.IgE-Bestimmungen: Nachweisgrenz: 0,10 kU/l CAP-Klasse..0.....0,10 - 0,34 kU/l CAP-Klasse..1.....0,35 - 0,69 kU/l CAP-Klasse..2.....0,70 - 3,49 kU/l CAP-Klasse..3.....3,50 - 17,49 kU/l CAP-Klasse..4.....17,50 - 49,99 kU/l CAP-Klasse..5.....50,00 - 100,0 kU/l CAP-Klasse..6..... > 100,0 kU/l</p> <p>Hinweis: spez.IgE immer in Beziehung zum ges.IgE beurteilen (erhöhte Relevanz spez.IgE bei niedrigem ges.IgE) spez.IgE-Nachweis = Sensibilisierungsnachweis, klinische Relevanz wird durch Anamnese, Hauttest, ggf. Provokationstest gestellt</p> <p>.</p> <p>neum. 19.07.2014</p> <p>.</p>
Einheit	kU/L
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Referenzbereich	extrem erhöht: 99.99 <0.35kU/l(CAP-Kl.0)
letzte Änderung	29.11.2024 11:41