Cyfra 21-1 i.S. [IRMA] (Cisbio)

Abnahmevorschrift	Aktualisierung: 16.10.2015 (be) Präanalytik: Standarduntersuchungsmaterial: Serum
Einheit	ng/mL
Häufigkeit	wöchentlich
Klinische Hinweise	Klinische Indikation: Screening Diagnose Lunge NSCLC, CCC Follow-up Lunge NSCLC, CCC, Harnblase Prognose Lunge NSCLC (nach Stieber MLU 04-2009) Interpretation: nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom (NSCLC), Cervix- u. Ösophagus-Karzinom Leicht erhöhte Werte werden bei benignen Erkrankungen wie Zysten, Magenerkrankungen, Erkrankungen des Kolons/Rektums und bei akuter Hepatitis gefunden. Hinweis: -99,6% der wahrscheinlich Gesunden und 95% der Patienten mit einer gutartigen Lungenerkrankung weisen Serumkonzentrationen <3,3 ng/ml auf (Herstellerinformation). -keine Alters- oder Geschlechtsabhängigkeit -kein Einfluss durch Tabakkonsum
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Referenzbereich	extrem erhöht: 10.0 < 3.3
Verfahren	IRMA
letzte Änderung	18.03.2026 14:48