Akt. T-Helferz. (CD3+/ CD4+/ HLADR+) im EDTA-Blut (%)

Abnahmevorschrift	EDTA Vollblut Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Freitag 12.00 angeboten. Immunphänoptypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 1-2 Werktagen
Einheit	%
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 11.00 Uhr
Klinische Hinweise	Indikation: Immunstatus Relativer Anteil von aktivierten T-Helferzellen (CD3+/ CD4+/ HLADR+). Bei T-Lymphozyten gilt die Expression von HLA-DR als Aktivierungsmarker. Als so genannter late activation marker ist dieses Oberflächenmolekül charakteristisch für chronische Infektionen und Autoimmunerkrankungen. Bei diesem Parameter handelt es sich um einen Forschungsparameter, für den kein Referenzbereich verfügbar ist.
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	nicht definiert Kommentar: Forschungsparameter, keine Referenzbereiche verfügbar.
Verfahren	Flowzytometrie
letzte Änderung	18.03.2026 14:45